



	Struwit moczowy	Nerki i szczawian	Wątroby	Waga i cukrzyca	Hipoalergiczny (Kor)	Hipoalergiczny (Owad)	Hipoalergiczny (Jagnięcina)	Hipoalergiczny (Królik)	Hipoalergiczny (Indyk)	Hipoalergiczny (Dzicyzna)	Jelitowy	Wykluczenie	Regulator	Mobilność i Geriatria	Dermisprawy	Płyn regeneracyjny	Unikalne białko (Kor)	Unikalne białko (Jagnięcina)	Unikalne białko (Królik)	Unikalne białko (Indyk)	Unikalne białko (Dzicyzna)	Antystruwit	Balansować	Wsparcie trawienia	Wsparcie jelit	Mobilność	Szczepnik	Dorośli
	ASD	RID	HLD	WRD	HPD	IPD	LRD	RRD	TPD	VPD	DPD	NVD	QHD	MGD	OCF	CCL	UPH	UPL	UPR	UPT	UPV	UAS	VMS	PES	FBS	MJS	CPF	MXF
Wskazania	Kamica struwitowa (rozpuszczanie)																				V							
	Kamica struwitowa (zapobiegawczo)	V																			V							
	Kamica moczowa szczawianu wapnia (zapobiegawczo)		V			V																						
	Kamica moczowa cystyny (zapobiegawczo)		V			V						V																
	Kamica moczowa (zapobiegawczo)		V											V														
	Niewydolność nerek		V										V															
	Choroba serca																											
	Zapalenie wątroby			V																								
	Stłuszczenie																											
	Zaburzenia trzustki																							V				
	Zaburzenia żołądkowo-jelitowe			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V	V				V			
	Nadwrażliwość pokarmowa				V^	V^	V^	V^	V^	V^	V^	V	V				V^	V^	V^	V^	V^		V					
	Zaburzenia związane z glutenem				V	V	V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V	V							
	Atopia												V															
	Otyłość			V										V														
	Cukrzyca			V																								
	Zaparcie			V																					V			
	Zaburzenia stawów													V												V		
	Płytką nazębną														V													
	Rekonwalescencja po operacji / niedożywieniu															V												
	Ciąża / laktacja															V											V	V
	Nadaje się dla szczeniąt			V	V^			V	V		V^		V				V	V	V	V	V		V		V		V	

* = Z wyjątkiem (bardzo) dużych szczeniąt poniżej 12 miesiąca życia | ^ = Z wyjątkiem pacjentów z nadwrażliwością na źródło białka zawarte w tym produkcie